

# ENSAIOS IMUNOFLUORESCENTES

[vetex.vet.br](http://vetex.vet.br)

## Lipase Específica

A pancreatite é uma doença de difícil diagnóstico por apresentar sinais inespecíficos. Nos cães, os sinais clínicos mais comuns são: anorexia, vômito e diarreia. Já os gatos apresentam letargia, anorexia e perda de peso.

A concentração da lipase pancreática específica não é afetada por problemas renais ou pela administração de corticoides, ao contrário da lipase sérica.

Trata-se de um teste quantitativo que permite a mensuração da concentração de lipase específica do pâncreas canino e felino.

\*Amostra: soro.

## Proteína C Reativa (PCR)

É um marcador inflamatório em tempo real para cães. A PCR é produzida pelo fígado e sua concentração sanguínea se eleva quando há um processo inflamatório ou infeccioso, de forma mais rápida e eficiente que a contagem total de leucócitos.

Embora o exame não indique onde há uma inflamação ou infecção, o aumento nos seus valores é preocupante e precisa ser investigado.

\*Amostra: soro/plasma (heparina).

## SDMA (dimetilarginina simétrica)

O SDMA é um biomarcador específico da função renal, sendo eliminado principalmente por filtração renal, gerando uma boa estimativa da taxa de filtração glomerular (TFG).

O exame deve ser realizado juntamente com a dosagem de creatinina, urinálise e relação proteína/creatinina urinária, para auxiliar no diagnóstico precoce da doença renal.

\*Amostra: soro.

O VETEX realiza ensaios de imunofluorescência que possuem uma sensibilidade maior comparada aos testes rápidos.

Estes exames são realizados em nossos laboratórios, proporcionando um resultado rápido e preciso.

**Entre em contato com nossa equipe e conheça todas as vantagens que o exame pode trazer.**