



AVALIAÇÃO

- Padrão de crescimento;
- Organização celular;
- Presença de distúrbios circulatórios;
- Presença de agentes infecciosos;
- Diferenciação de processos hiperplásicos/neoplásicos de inflamação;
- Dermatopatologia;
- Entre outros.



A coleta **incisional** é recomendada para lesões difusas e tem, como **limitação**, a representatividade da lesão.

RESULTADOS

NEOPLÁSICO

- Benigno x Maligno;
- Presença/ausência de metástase;
- Avaliação de margem.

AUTOIMUNE

- Correlação clínica.

INFLAMATÓRIO

- Crônico x Agudo;
- Processos alérgicos;
- Não infeccioso x Infeccioso.

Exames complementares

histopatológico + avaliação de margem
histopatológico + imunoistoquímica
histopatológico + cultura bacteriana/fúngica



Coleta **incisional** não é o material mais adequado para avaliação de margem.

MÉTODOS DE ENVIO E ACONDICIONAMENTO

ENVIO

Identificação e histórico

- Local de coleta;
- Tipo de lesão;
- Forma de coleta;
- Identificação dos fragmentos;
- Exames complementares;
- Evolução;
- Fotos das lesões;
- Suspeita clínica.

ACONDICIONAMENTO

Recipiente

- Pote de boca larga;
- Compatível com tamanho da amostra;
- Com formol suficiente para submergir a peça;
- Acondicionamento de amostras múltiplas separadamente.



FORMOL 10%

O volume insuficiente ou ausência do formol pode prejudicar a avaliação histopatológica.



Toda informação de conhecimento do médico veterinário clínico, será importante para o diagnóstico final do patologista.